



PREMACOX F

Especies de destino



Alimentación de rumiantes en primeras edades.

Composición

Arcilla caolinítica, arcilla clinoptilotita, arcilla bentonita, carbonato de calcio, dextrosa, sorbitol, cloruro de sodio, harina de algarroba, almidón de trigo.

Propiedades

- Riesgo de falta de palatabilidad en el ganado joven (antes del destete). Sin problemas de palatabilidad en corderos y cabritos.
- Contribuye a la gestión del riesgo parasitario ligado a la presencia de coccidios con su núcleo vegetal.
- Ayuda a prevenir la diarrea en animales jóvenes con sus diferentes arcillas.

	Arcilla de caolin	Arcillas Bentonitas	Arcillas de clinoptilotita
Forma 3D			
Absorción de líquidos	++	+++	+
Vendaje gástrico	+++	++	+
Prevención de los trastornos intestinales	++	++	+++
Efecto amortiguador	+	+	+++
Secuestro de nitrógeno amoniacal	+	+	+++

- Contiene un núcleo vegetal de equinácea, regaliz, orégano y cítricos.

Modo de empleo

A libre disposición.
estimar un consumo medio de :

Ovino y caprino: 20 a 30 g por cordero o cabrito.
Bovinos jóvenes: de 150 a 250 g/día según el peso.

Garantías analíticas

Calcio :	14 %
Magnesio :	0.2 %
Sodio :	1.5 %
Cenizas insolubles en HCl :	38 %

Aditivos (por kg)

Vitaminas

Vitamina A (3a672a) :	300 000 UI
Vitamina D3 (3a671) :	75 000 UI
Vitamina E (3a700) :	300 UI

Oligoelementos :

Zinc (quelatos de zinc e hidrato de glicina) :	1 500 mg
--	----------

Aminoácidos :

DL metionina (3c301) :	5 000 mg
Monocloruro de L-lisina (3c322) :	12 600 mg

Arcillas :

caoliníticas(E559) :	188 000 mg
clinoptilolíticas (1g568) :	150 000 mg
Bentonita(1m558i) :	100 000 mg

Sustancias aromáticas

2b - Mezcla de sustancias aromáticas.

Presentación

Harina
Cubo de 20 kg